

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
ФИЛИАЛА ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ



№ 17 от 31.05.2024 г.

660049 г. Красноярск, Сурикова ул., 54 в
Тел/Факс (391) 227-74-63, 227-28-89, e-mail: krstazr@mail.ru
Сайт: rsc024.ru

**Рекомендации по борьбе с гусеницами капустной моли в
Красноярском крае**

Филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю подготовлено сигнализационное сообщение №5 от 31.05.2024 г. «Отрождение гусениц капустной моли на посевах рапса», переданное по электронной почте в районные администрации, отделы филиала, а также в отдел развития растениеводства и инженерно-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства Красноярского края.



Повреждения гусеницами

Первые 2-3 дня после отрождения питание гусеницы проходит в «минах» с нижней части листа, затем гусеница выбирается наружу и живет открыто. В местах, где проходило питание гусениц ранних возрастов, появляются «окошки» — разрывы. Гусеница светло-зеленая, веретеновидной формы, при прикосновении падает с листьев и может повиснуть на паутинке.

Предупредительные меры борьбы:


- глубокая зяблевая вспашка полей (20–22 см после крестоцветных);
- уничтожение крестоцветных сорных растений, на которых зимуют куколки и питаются нектаром бабочки;
- соблюдение севооборотов и пространственной изоляции между крестоцветными культурами;
- обкашивание обочин, дорог и прилегающей территории от крестоцветных сорных растений;
- применение полного комплекса минеральных удобрений;
- фитосанитарная оценка посевов крестоцветных культур.

В случае превышения численности в 2-3 гус./раст. или 10% заселенных растений необходимо провести защитные мероприятия инсектицидами, указанными в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов» разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2024 году.

Перечень действующих веществ входящих в состав пестицидов, применяемых против гусениц капустной моли на рапсе: Ацетамиприд (Медоуз, МД); Бифентрин (Клипер, КЭ); Диметоат (Биммер, КЭ, Би-58 Топ, КЭ, Данадим (Эксперт КЭ); Диметоат + альфа-циперметрин (Кинфос Нео, КЭ); Дифлубензурон (Герольд, ВСК); Дифлубензурон + имидаклоприд (Локустин, КС); Дифлубензурон + эсфенвалерат (Скарабей, СЭ); Имидаклоприд + альфа-циперметрин (Эсперо, КС); Имидаклоприд + бифентрин (Галил, КС); Клотианидин + индоксакарб (Кираса, ВДГ); Лямбда-цигалотрин (Спарвиэро, МКС); Лямбда-цигалотрин + тиаметоксам (Готика, КС); Малатион (Алиот, КЭ, Карбофот, КЭ, Фуфанон Эксперт, ВЭ); Пирипроксифен (Апекс, МКЭ); Тиаметоксам + альфа-циперметрин (Тиальф, КС); Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (Кунгфу Супер, КС, Фактория, МКС); Хлорпирифос + бифентрин (Пирелли, КЭ); Хлорпирифос + циперметрин (Сектор, КЭ).

За рекомендациями по проведению учета гусениц капустой моли следует обращаться в районные и межрайонные отделы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю.

Руководитель филиала



А. В. Малинников