

## СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 9 от 11 июля 2024 года

Исх. № 1886 11.07.24

660049, г. Красноярск, Сурикова ул., 54 «В»  
Тел/Факс (391) 227-74-96, 227-28-89, e-mail: [krstazr@mail.ru](mailto:krstazr@mail.ru)  
Сайт: [rsc024.ru](http://rsc024.ru)

### Отрождение гусениц капустной моли 2 поколения на посевах рапса

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю сообщает, что на посевах ярового рапса началось отрождение гусениц капустной моли 2 поколения.



*Гусеница капустной моли*


Особое внимание стоит уделять посевам, на которых лет бабочек наблюдался в дневное время, это говорит о высокой плотности популяции, следовательно на таких полях стоит ожидать высокой численности гусениц 2 поколения. Первые 2-3 дня питание гусеницы проходит в «минах», затем гусеница выбирается наружу и живет открыто. В местах, где проходило питание гусениц ранних возрастов, появляются «окошки» – разрывы. Гусеница светло-зеленая, веретеновидной формы, при прикосновении падает с листьев и может повиснуть на паутинке.

Агрономическим службам хозяйств рекомендуется обследовать посевы рапса для выявления вредителя, особое внимание надо уделить посевам, на которых был зафиксирован лет бабочек в днем. Защитные мероприятия проводить при численности превышающей экономический порог вредоносности (ЭПВ) 2-3 гусеницы на растение или 10% заселенных растений. Препараты наиболее эффективны от гусениц 1 и 2 возраста.

По вопросам фитосанитарных обследований посевов с.-х. культур и получения рекомендаций по их защите обращаться в районные (межрайонные) отделы филиала.

Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов и производственных помещений). Необходимо строго соблюдать регламент применения препаратов, правила личной гигиены и технику безопасности.

Руководитель филиала

 А.В. Малинников