

## СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 3 от 28 мая 2024 года

660049, г. Красноярск, Сурикова ул., 54 «В»  
Тел/Факс (391) 227-74-96, 227-28-89, e-mail: [krstazr@mail.ru](mailto:krstazr@mail.ru)  
Сайт: [rsc024.ru](http://rsc024.ru)

Исх. № 438 от 28.05.24

### Лет бабочек капустной моли на посевах рапса



Капустная моль

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю сообщает, что на посевах рапса отмечается средний лет бабочек капустной моли. Бабочки вредителя питаются нектаром и водой на цветущих сорняках.

Самки откладывают яйца небольшими группами на нижнюю поверхность листа. Яйца очень мелкие - 0,4 мм, зеленоватые и практически не заметны для человеческого глаза. Проведение защитных мероприятий против бабочек капустной моли и яиц нецелесообразно.

На основании биологии развития вредителя и складывающихся погодных условий начало отрождения гусениц капустной моли на рапсе ожидается в период 1 – 10 июня. Напоминаем, что первые 2-3 дня гусеницы развиваются под эпидермисом листа в «минах» и не доступны для действия инсектицидов.

Необходимо вести мониторинг посевов рапса для выявления гусениц первых возрастов, проводить защитные мероприятия при численности превышающей экономический порог вредоносности (ЭПВ) - 2-3 гусеницы на растение или 10% заселенных растений. Препараты наиболее эффективны от гусениц 1 и 2 возраста.

По вопросам фитосанитарных обследований посевов с.-х. культур и получения рекомендаций по их защите обращаться в районные (межрайонные) отделы филиала.

Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов и производственных помещений). Также необходимо строго соблюдать регламент применения агрохимикатов, правила личной гигиены и технику безопасности.

Руководитель филиала

  
А.В. Малинников