

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
ФИЛИАЛА ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ



№ 17 от 09.07. 2020г.

660049 г. Красноярск, Сурикова ул., 54 в

Тел/Факс (391) 227-74-63, 227-28-89, e-mail: krstazr@mail.ru

Сайт: rsc024.ru

**Информация по особо опасным вредителям
в Красноярском крае на 8 июля 2020 года**

НЕСТАДНЫЕ САРАНЧОВЫЕ



Фото 1. Имаго сибирской кобылки



Фото 2. Гусеница лугового мотылька на сорняках

Популяция состоит преимущественно из окрылившихся взрослых особей, развивающихся на сенокосах и пастбищах, где их средняя численность составляет 5,7 экз/м², что ниже ЭПВ (30 экз/м²). Наиболее заселены саранчовыми травы на востоке и центре края. В Емельяновском районе на 700 га пастбищ насчитывается 11 экз/м², на 100 га в Дзержинском районе – 12 экз/м².

В первой декаде июля вредитель развивается на зерновых полях 14 районах края со средней численностью 2,3 экз/м²,

что ниже ЭПВ (5 экз/м²), максимально – 8 экз/м² она 100 га зерновых в Емельяновском районе. Обработано 550 га.

ПРОГНОЗ: Увеличение численности саранчовых на посевах зерновых.

ЛУГОВОЙ МОТЫЛЕК

Вредоносность лугового мотылька на территории края носит очажный характер преимущественно на юге региона – в Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Минусинском и Шушенском районах, в пригороде Красноярска (Березовский и Емельяновский районы), а также в двух

восточных районах (Канский, Рыбинский) и в одном западном – Ужурский. Средняя численность гусениц составляет 10 экз/м² (ЭПВ=5-10 гус/м²). Гусеницы повреждают

многолетние бобовые травы (люцерна, эспарцет), кукурузу, рапс, овощи. В Ужурском районе на 0,22 тыс.га посевов ячменя обнаружен очаг – 40-60 экз/м². Обработано 550 га в хозяйствах Ермаковского, Канского, Ужурского и Шушенского районов.

ПРОГНОЗ: *Очаговая вредоносность гусениц на посевах и посадках с.-х. культур продолжится.*



Фото 3. Личинка клопа вредной черепашки

численности личинок на посевах яровых зерновых.

КЛОП ВРЕДНАЯ ЧЕРЕПАШКА

продолжает развиваться на посевах зерновых культур в южных районах края. В первой декаде июня начались переходы вредителя с озимых зерновых на яровые, где в настоящее время отмечается питание личинок вредителя со средней численностью 0,29 экз/м², что ниже ЭПВ (1-2 лич/м²). Максимальная численность - 0,5 лич/м² отмечена на 230 га в Курагинском районе.

ПРОГНОЗ: *Питание и рост*

ПЕРОНОСПОРОЗ НА ПОСЕВАХ ЯРОВОГО РАПСА



Фото 4. Проявление пероноспороза на листьях ярового рапса.

В конце июня на посевах ярового рапса началось проявление заболевания, развитие которого в настоящее время носит очажный характер в Абанском, Емельяновском, Минусинском, Новоселовском, Ужурском и Уярском районах. Поражено от 10 до 50% растений и от 10 до 30% листовой поверхности. До настоящего времени пероноспороз в крае на культуре не отмечался. Недобор зеленой массы рапса от болезни может составлять более 25%, а семян – более 15%.

Источником инфекции являются зараженные семена. Инфекция активно развивается при температуре воздуха +20...+22⁰С в условиях достаточного или избыточного увлажнения. Как раз такая погода и установилась на территории края. Проведение защитных мероприятий рекомендуется при первых признаках заболевания препаратами тебуконазольной группы, также будет эффективно применение медьсодержащих фунгицидов.

Руководитель филиала



А.В. Малинников