

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК  
ФИЛИАЛА ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ



№ 18 от 30.07. 2020г.

660049 г. Красноярск, Сурикова ул., 54 в

Тел/Факс (391) 227-74-63, 227-28-89, e-mail: [krstazr@mail.ru](mailto:krstazr@mail.ru)

Сайт: [rsc024.ru](http://rsc024.ru)

Информация по особо опасным вредителям  
в Красноярском крае на 30 июля 2020 года

**НЕСТАДНЫЕ САРАНЧОВЫЕ**

Популяция состоит из взрослых особей, которые продолжают развиваться преимущественно на сенокосах и пастбищах, где в условиях теплой и влажной погоды сформировался хороший травостой. Здесь их численность составляет 7 экз/м<sup>2</sup>, что значительно ниже экономического порога вредоносности (ЭПВ) равного 30 экз/м<sup>2</sup>. Наиболее заселенными вредителем продолжают оставаться угодья в восточных и центральных районах края. Из-за достаточной кормовой базы на естественных угодьях активного заселения посевов зерновых культур саранчовыми не отмечается. Вредитель заселил 68% обследованной площади со средней численностью 3 экз/м<sup>2</sup>, что также ниже ЭПВ (5 экз/м<sup>2</sup>). В крае обработано всего 0,2 тыс.га посевов ячменя в Канском районе, где численность саранчовых была на уровне ЭПВ.




Рис. 1. Заселение нестадными саранчовыми естественных трав в районах Красноярского края на 30.07.2020г.

Рис. 2. Заселение нестадными саранчовыми посевов зерновых культур в районах Красноярского края на 30.07.2020г.



**ПРОГНОЗ:** дальнейшего роста численности и вредоносности нестадных саранчовых на с.-х. угодьях не ожидается.

### ЛУГОВОЙ МОТЫЛЕК




Рис. 3. Заселение посевов с.-х. культур гусеницами лугового мотылька в районах Красноярского края на 30.07.2020г.

В 15 районах края отмечается очажная вредоносность гусениц вредителя на посевах с.-х. культур. Заселено почти 30% обследованной площади (13,21 тыс.га). Средняя численность гусениц составляет 15 экз/м<sup>2</sup>. Преимущественно заселены посевы кукурузы (45%) и ярового рапса (25%). Всего в крае обработано 9,68 тыс.га в 13 хозяйствах.

**ПРОГНОЗ:** в конце июля - начале августа начнется окукливание гусениц вредителя. Вылет бабочек первого поколения ожидается после 10 августа. В связи с возможными ранними заморозками в августе отрождение гусениц второго поколения не прогнозируется.

### КОЛОРАДСКИЙ ЖУК




Рис. 4. Заселение районов Красноярского края колорадским жуком на 30.07.2020г.

Наблюдается активное продвижение вредителя в восточные (Абанский, Дзержинский, Саянский, Партизанский) и северные (Большемуртинский, Мотыгинский) районы региона. На частных посадках картофеля численность личинок колорадского жука составляет до 50 экз/куст, что в 2,5-5 раз превышает экономический порог вредоносности (ЭПВ) равный 10-20 лич/куст при заселении 5-10% растений.

**ПРОГНОЗ:** в конце июля – начале августа начнется окукливание вредителя. В конце первой декады августа выйдут жуки летнего поколения (возможно только на юге региона), во второй декаде месяца – появятся личинки второго поколения.