

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 11 от 22 июля 2024 года

Исх. № 1228 от 22.07.2024

660049, г. Красноярск, Сурикова ул., 54 «В»
Тел/Факс (391) 227-74-96, 227-28-89, e-mail: krstazr@mail.ru
Сайт: rsc024.ru

Отрождение личинок пшеничного трипса

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю сообщает, что на посевах яровых зерновых, находящихся в фазе молочной спелости, началось отрождение личинок пшеничного трипса.



Только отродившиеся личинки имеют зеленовато-желтый цвет, через несколько часов становятся ярко-красными. Отродившиеся личинки до формирования зерна питаются соком колосковых чешуек, цветочных пленок, тычинок и пестиков. Питание личинок в период формирования, разрастания и налива зерна в основном протекает в бороздке. Переход в почву начинается в фазу восковой спелости. Личинка при питании вызывает разную степень повреждения зерновки, отражающуюся не только в снижении массы зерна, но и в снижении семенных качеств.

Агрономическим службам хозяйств рекомендуется на регулярной основе проводить обследования посевов для выявления вредителя. В случае превышения численности в 40-50 экз./колос (засуха 30 экз./колос) необходимо провести защитные мероприятия инсектицидами, указанными в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов» разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2024 году.

Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов и производственных помещений). Необходимо строго соблюдать регламент применения препаратов, правила личной гигиены и технику безопасности.

За рекомендациями по проведению учета гусениц капустой моли следует обращаться в районные и межрайонные отделы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю.

Руководитель филиала

А.В. Малинников